

D&H Drench[®]plus

Sistema de Suplementación Nutricional e Hidratación Intraruminal

Suplemento nutricional para ser suministrado en vacas frescas como parte del programa de manejo que evite la aparición de enfermedades metabólicas.

Fuente de agua y energía, provee calcio rápidamente disponible, electrolitos, cultivo de levaduras y múltiples vitaminas y oligoelementos.

Beneficios:

- Reduce la hipocalcemia posparto y en aquellas vacas con retención de placenta y metritis.
- Evita la deshidratación y reincorpora los electrolitos perdidos durante el parto.
- Minimiza la hipomagnesemia y favorece la recuperación de la hipocalcemia.
- Mantiene un buen ambiente ruminal y reduce el riesgo de acidosis subclínica.
- Estimula el apetito y mejora el consumo de materia seca durante el período.
- Menor riesgo de desplazamiento de abomaso.
- Potencia el pico de producción.
- Disminuye la incidencia de cetosis.

Máxima energía en una sola dosis

Perfil Nutricional por Kg. de Producto:

CALCIO 45,00 grs.

MAGNESIO 8,00 grs.

POTASIO 14,50 grs.

SODIO 4,50 grs.

CLORO 16,00 grs.

Vitamina A 75000 UI

Vitamina D 15000 UI

Vitamina E 1000 UI

Niacina 6,00 grs.



Indicaciones de Uso:

- En vacas recién paridas con o sin síntomas de hipocalcemia.
- Como tratamiento de soporte en vacas bajo tratamiento de retención de membranas fetales, metritis puerperal, mastitis o cetosis leve.
- En vacas deprimidas, apáticas o inapetentes como revitalizante, hidratante y estimulante del apetito.
- En vacas con sintomatología de Desplazamiento de Abomaso.



Nómina de Ingredientes: Propilenglicol, propionato de calcio, cloruro de potasio, sulfato de magnesio, óxido de magnesio, suplemento vitamínico mineral, niacina y excipientes c.s.p.

Dosis: Suministrar 2,0 litros de producto con 20 a 30 litros de agua tibia intraruminal por sonda esofágica. La cantidad de tratamientos será indicada por el Médico Veterinario actuante.

Presentación del producto:

Producto líquido en envase de 20 litros.

Sistema: Bomba de Aplicación

- Este producto requiere para su administración de un aplicador ruminal de líquidos especial (bomba y sonda).
- La aplicación estará a cargo de personal capacitado y por indicación del profesional responsable.
- Seguir estrictamente las indicaciones de uso tanto del suplemento como del sistema aplicador ubicadas en sus respectivas etiquetas para los productos de **NUTREFEED S.A.**



Terapia de Apoyo Nutricional

Vacas que hayan padecido hipocalcemia clínica:

- Una toma 3 horas después del tratamiento inicial con borogluconato de Calcio endovenoso.
- Una sola aplicación es suficiente. Si la vaca se ve lenta y apática repetir una medida 24 horas más tarde.

Vacas con retención de placenta, metritis puerperal, mastitis:

- Tratar las afecciones siguiendo los lineamientos quimioterápicos indicados por el veterinario responsable.
- Una medida al momento del diagnóstico.
- Repetir una medida 24 horas más tarde.

Vacas con cetosis / síntomas de desplazamiento de abomaso:

- Tratar la cetosis siguiendo los lineamientos terapéuticos (glucosa 50% E.V, corticoides parenterales) indicados por el veterinario responsable.

Vacas recién paridas:

- Una toma inmediatamente luego del parto.
- Una sola aplicación es suficiente. Si la vaca se ve lenta y apática repetir una medida 24 horas más tarde.

